

| Classification des patients | Première intention | Deuxième intention |
|---|--|---|
| Adultes (qui ne sont pas enceintes) | Doxycycline: 300 mg par voie orale en une seule dose | <ul style="list-style-type: none"> • Azithromycine: 1 gramme en une seule dose • Tétracycline: 500 mg 4 fois par jour pendant 3 jours • Ciprofloxacine: 1 gramme en une seule dose • Erythromycine: 500 mg 4 fois par jour pendant 3 jours. |
| Femmes enceintes | Azithromycine: 1 gramme en une seule dose | Erythromycine: 500 mg 4 fois par jour pendant 3 jours |
| Enfants \geq 12 mois et capables d'avaler des comprimés et/ou des tablettes. | <ul style="list-style-type: none"> • Azithromycine: 20 mg/kg en une seule dose • Erythromycine: 12.5 mg/kg 4 fois par jour pendant 3 jours. • Doxycycline: 2-4 mg/kg en une seule dose | <ul style="list-style-type: none"> • Ciprofloxacine: 20 mg/kg en une seule dose • Tétracycline: 12.5 mg/kg 4 fois par jours pendant 3 jours |
| Enfants de <12 mois et Autres se trouvant dans l'incapacité d'avaler les comprimés et/ou les tablettes. | <ul style="list-style-type: none"> • Azithromycine en suspension orale: 20 mg/kg en une seule dose • Erythromycine en suspension orale: 12.5 mg/kg 4 fois par jour pendant 3 jours • Doxycycline en suspension orale: 2-4 mg/kg en une seule dose | <ul style="list-style-type: none"> • Ciprofloxacine en suspension orale: 20 mg/kg en une seule dose • Tétracycline en suspension orale: 12.5 mg/kg 4 fois par jour pendant 3 jours. |